

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BROADLINE spot na otopina za mačke < 2,5 kg

BROADLINE spot na otopina za mačke 2,5-7,5 kg

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatne tvari:

Svaki aplikator sadrži jediničnu dozu u količini:

| BROADLINE spot-on solucija | Volumen otopine jedinične doze (ml) | Fipronil (mg) | S-Metopren (mg) | Eprinomectin (mg) | Prazikvantel (mg) |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mačke < 2,5 kg | 0,3 | 24,9 | 30,0 | 1,20 | 24,9 |
| Mačke 2,5 - 7,5 kg | 0,9 | 74,7 | 90,0 | 3,60 | 74,7 |

Pomoćne tvari:

Butilhidroksitoluen (E321) 1mg/ml.

Za popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

FARMACEUTSKI OBLIK

Spot-on otopina.

Bistra bezbojna do žuta otopina.

KLINIČKE POJEDINOSTI

Ciljne vrste životinja

Mačke

Indikacije za primjenu s navođenjem ciljne vrste

Za mačke invadirane ili u opasnosti od invazije različitim trakavicama, oblicima i ektoparazitima. Veterinarsko medicinski proizvod je osobito indiciran kada su životinje invadirane sa sve tri skupine parazita.

Ektoparaziti

- Liječenje i prevencija infestacije buhama (*Ctenocephalides felis*). Uništavanje buha u roku od 24 sata. Jedan tretman sprečava daljnju infestiranost najmanje tijekom mjesec dana.
- Prevencija razvoja jaja, ličinki i kukuljica buha u okolišu tijekom razdoblja dužeg od mjesec dana.
- Proizvod se može koristiti kako bi se spriječio nastanak alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD).
- Liječenje i prevencija infestacije krpeljima (*Ixodes ricinus*). Uništavanje krpelja u roku od 48 sati. Jedna primjena sprječava daljnju infestiranost tijekom razdoblja od 4 tjedna.

Trakavice

- Liječenje invazija trakavicama (*Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus multilocularis*).

Oblici

- Liječenje invazije želučano crijevnim oblicima (L3 ličinke, L4 ličinke i odrasli oblici *Toxocara cati*, L4 ličinke i odrasli oblici *Ancylostoma tubaeforme* i odrasli oblici *Toxascaris leonina* i *Ancylostoma braziliense*).
- Liječenje invazije oblicima u mokraćnom mjehuru (*Capillaria bora*).
- Prevencija dirofilarioze (mikrofilarije *Dirofilaria immitis*) tijekom mjesec dana.

Kontraindikacije

Ne koristiti u bolesnih ili životinja u rekonvalescenciji.

Ne koristiti u kunića.

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Kod primjene veterinarsko medicinskog proizvoda, posebnu pozornost treba posvetiti primjeni na dugodlakim pasminama te ga nanositi izravno na kožu, a ne na dlaku. Pogrešna primjena može dovesti do niže bio-raspoloživosti i time slabijeg učinka.

Važno je nanijeti veterinarsko medicinski proizvod na mjesto nedostupno lizanju te spriječiti da se životinje međusobno ližu.

Nema raspoloživih podataka o utjecaju kupanja/šamponiranja na učinkovitost veterinarsko medicinskog proizvoda u mačaka. Kratkotrajni doticaj životinje s vodom, jednom ili dva puta unutar mjesec dana nakon primjene, neće bitno umanjiti učinkovitost. Predostrožnosti radi, nije preporučljivo kupati životinju dva dana nakon primjene.

Nakon tretmana s BROADLINE-om, krpelji će uglavnom biti ubijeni u roku od 48 sati nakon infestacije, bez krvnog obroka. Kako je moguća pojedinačna infestacija krpeljima i nakon primjene, ne može se u potpunosti isključiti prijenos zaraznih bolesti.

Invazije trakavicama su moguće ako se ne provodi kontrola posrednika, kao što su buhe, miševi i sl. Otpornost parazita na bilo koju skupinu antiparazitika se može razviti nakon česte uporabe proizvoda iz iste skupine. Epidemiološki podaci o trenutnoj osjetljivosti ciljnih vrsta treba uzeti u obzir kako bi se smanjila mogućnost pojave rezistencije u budućnosti.

Mačke u endemskim područjima s dirofilariozom, ili one koje su putovale u endemska područja, mogu biti invadirane odraslim dirofilarijima. Iako se veterinarsko medicinski proizvod može sigurno primijeniti na mačkama invadiranim odraslim dirofilarijama, ne postoje dokazi o ljekovitom učinku. Stoga se preporučuje da se sve mačke u dobi od 6 mjeseci ili starije, a žive u endemskim područjima za dirofilariozu, testiraju na prisustvo odraslih oblika *Dirofilaria immitis* prije nego što se primjeni veterinarsko medicinski proizvod.